

化学療法未治療の根治切除不能な進行・再発の食道癌
Nivo+FP(CDDP 80/5-FU 800) 療法

4週毎

薬剤・略号		商品名	投与量		投与日
ニボルマブ	Nivo	オプジーボ	240	mg/body	d1、15
シスプラチン	CDDP	シスプラチン	80	mg/m ²	Day1
フルオロウラシル	5-FU	5-FU	800	mg/m ²	Day1～5

Day1

① 生理食塩液 100ml / ルートキープ

Y②

ニボルマブ240mg/body + 生食50ml 30分でDiv

0.2又は0.22µmのインラインフィルター付ルートを使用

Y③ 生理食塩液 100ml 30分でDiv/フラッシュ
Y字から投与バックアダプタ使用

④ ソルデム3A 500ml + 塩酸メクロプラミド(10mg/2ml) 1A / 90min

⑤ 生理食塩液 500ml + メイロン(7%20ml) 1A / 90min

⑥ アロカリス(235mg/10ml) 1V + グラニセトンバッグ(1mg/50ml) 1P
+ デキサート(6.6mg/2ml) 1V / 30min

Y⑦

シスプラチン ()mg/body + 生理食塩液 300ml / 2hr

S 生理食塩液 100ml / Sルートプライミング用 (入院一般注射)

S⑧

フルオロウラシル ()mg/body + 生理食塩液 500ml / 24hr 持続

⑨ 生理食塩液 500ml + メイロン(7%20ml) 1A / 90min


⑩ ソルデム3A 500ml + ラシックス(2mg/1ml) 1A / 90min

⑪ グラニセトンバッグ(1mg/50ml) 1P / 15min

⑫ マンニトール 300ml / 60min

⑬ ソルデム3A 500ml + 塩酸メクロプラミド(10mg/2ml) 1A / 90min

【ルートの組み立て推奨例】



Day2,3

- ① デキサート(6.6mg/2ml) 1V + 生理食塩液 50ml / 15min
- ② ソルデム3A 500ml+塩酸メトクロプラミド(10mg/2ml) 1A / 90min
- ③ 生理食塩液 500ml + メイロン(7%20ml) 1A / 90min
- ④ マンニトール 300ml / 60min
- ⑤ ソルデム3A 500ml + 塩酸メトクロプラミド(10mg/2ml) 1A / 90min


S ⑥ フルオロウラシル ()mg/body + 生理食塩液 500ml / 24hr 持続

Day4,5

S① フルオロウラシル ()mg/body + 生理食塩液 500ml / 24hr 持続

S 生理食塩液 100ml / Sルートフラッシュ用
バックアダプタ使用(一般注射で入力、最終日のみ)

【ルートを組み立て推奨例】



Day15

① 生理食塩液 100ml / ルートキープ 終了後フラッシュ用

Y② ニボルマブ240mg/body + 生食50ml 30分でDiv
0.2又は0.22 μ mのインラインフィルター付ルートを使用