

再発非小細胞肺癌(非扁平上皮がん)

Ipi+3wNivo+CDDP+PEM療法

※導入療法1コース(導入・維持療法併せて最長24か月)

6週毎

薬剤・略号		商品名	投与量	投与日	
ニボルマブ	Nivo	オプジーボ	360mg/body	Day1、22	q3w q6w
イピリムマブ	Ipi	ヤーボイ	1mg/kg	Day1	
ペメトレキセド	PEM	アリムタ	500mg/m ²	Day1、22	
シスプラチン	CDDP	シスプラチン	75mg/m ²	Day1、22	

投与7日 以上前～	メチコバル注(500μg) 2A im パンビタン末 1g 1日1回内服
--------------	---

Day2-4	デキサメタゾン錠 8mg/day
Day23-25	

Day1	① 生理食塩液 100ml / ルートキープ ② アロカリス(235mg/10ml) 1V + パロノセトロン(0.75mg/5ml) 1V + デキサート(6.6mg/2ml) 1.5V + 生理食塩液 100ml / 30min ③ 生理食塩液 100ml / フラッシュ用 Y ④ <u>ニボルマブ 360mg/body + 生理食塩液 50ml / 30min</u> 0.2または0.22μmのインラインフィルター付ルートを使用 Y ⑤ 生理食塩液 100ml / 30minフラッシュ用 Y字から投与バッグアダプタ使用 Y ⑥ <u>イピリムマブ()mg/body + 生理食塩液 20ml / 30min</u> 0.2又は0.22μmのインラインフィルター付ルートを使用 ニボルマブ投与終了後、30分以上あけて、投与を開始すること 生食又は5%糖液を用いて、1～4mg/mlの濃度に希釈すること 1～4mg/ml確保のため、生食50ml→生食20mlにして使用 Y ⑦ 生理食塩液 100ml / フラッシュ用 Y字から投与バッグアダプタ使用 Y ⑧ <u>ペメトレキセド()mg/body + 生理食塩液 100ml / 10min</u> Y ⑨ 生理食塩液 100ml / 30min フラッシュ用 ⑩ ソルデム3A 500ml + 硫酸Mg補正液(20mEq/20ml) 1A / 60min ⑪ 生理食塩液 500ml / 60min ⑫ マンニトール 300ml / 60min Y ⑬ <u>シスプラチン()mg/body + 生理食塩液 300ml / 120min</u> ⑭ ソルデム3A 500ml / 60min
------	---

Day22	
	① 生理食塩液 100ml / ルートキープ
	② アロカリス(235mg/10ml) 1V + パロノセトロン(0.75mg/5ml) 1V + デキサート(6.6mg/2ml) 1.5V + 生理食塩液 100ml / 30min
	③ 生理食塩液 100ml / フラッシュ用
Y	④ ニボルマブ 360mg/body + 生理食塩液 50ml / 30min 0.2または0.22 μ mのインラインフィルター付ルートを使用
Y	⑤ 生理食塩液 100ml / フラッシュ用 Y字から投与バッグアダプタ使用
Y	⑥ ペムトレキセド()mg/body + 生理食塩液 100ml / 10min
Y	⑦ 生理食塩液 100ml / 30min フラッシュ用
	⑧ ソルデム3A 500ml + 硫酸Mg補正液(20mEq/20ml) 1A / 60min
	⑨ 生理食塩液 500ml / 60min
	⑩ マンニトール 300ml / 60min
Y	⑪ シスプラチン()mg/body + 生理食塩液 300ml / 120min
	⑫ ソルデム3A 500ml / 60min

※ 添付文書に記載されているVB12製剤の使用方法は、「初回投与少なくとも7日前に1mgを投与し、その後9週(3コース)毎に投与終了後22日目まで投与」となっている。