

EGFR遺伝子エクソン20挿入変異陽性の切除不能な進行再発の非小細胞肺癌

Amivantamab+CBDCA+PEM療法 C1

3週毎

薬剤・略号等		商品名	投与量	投与日
カルボプラチン	CBDCA	カルボプラチン	AUC=5	Day1
ペメトレキセド	PEM	アリムタ	500mg/m ²	Day1
アミバンタマブ	Ami	ライブリバント	350mg	Day1
			1050mg/1400mg ※	Day2
			1400mg/1750mg ※	Day8
			1400mg/1750mg ※	Day15

※体重80kg未満/以上

投与7日以上前へメチコバル注(500μg) 2A im, パンビタン末 1g 1日1回内服

Day1,2,8,15 カロナール錠 1000mg/日 ※

※点滴開始時に内服

Day3 デキサメタゾン錠 4mg/日 ※

※必要に応じて処方

Day1

- ① 生理食塩液 100ml / ルートキープ 終了後フラッシュ用
- ② アロカリス(235mg/10ml) 1V + パロノセトロン(0.75mg/5ml) 1V
+ デキサート(6.6mg/2ml) 1.5V + ポララミン(5mg/1ml) 1A
+ ファモチジン(20mg/2ml) 1A + 生理食塩液 100ml / 30min
- Y ③ ペメトレキセド ()mg/body + 生理食塩液 50ml / 10min
- Y ④ カルボプラチン ()mg/body + 生理食塩液 250ml / 60min
- Y ⑤ 生理食塩液 100ml / フラッシュ用 Y字から投与、バッグアダプタ使用
- Y ⑥ アミバンタマブ ()mg/body + 生理食塩液250ml / ※

※Day1: 投与開始時50ml/時、投与2時間後75ml/時

最終容量が250mlとなるように調製する

0.2又は0.22μm以下のインラインフィルター付ルートを使用

Day2,8,15

- ① 生理食塩液 100ml / ルートキープ 終了後フラッシュ用
- ② デキサート(6.6mg/2ml) 1.5V + ポララミン(5mg/1ml) 1A
+ ファモチジン(20mg/2ml) 1A + 生理食塩液50ml / 15min
- ③ 生理食塩液 100ml / フラッシュ用
- Y ④ アミバンタマブ ()mg/body + 生理食塩液250ml / ※

※Day2: 投与開始時33ml/時(80kg以上は25ml/時),投与2時間後50ml/時

Day8: 65ml/時 Day15: 85ml/時

最終容量が250mlとなるように調製する

0.2又は0.22μm以下のインラインフィルター付ルートを使用

※ 添付文書に記載されているVB12製剤の使用方法は、「初回投与少なくとも7日前に1mgを投与し、その後9週(3コース)毎に投与終了後22日目まで投与」となっている。

20251101