主治医

胃がん

SP(CDDP60mg)

シスプラチン(CDDP)　60mg/m^2　(Day8)
TS-1(S-1)　80mg/m^2(Day1～21内服、1～2週休薬)　4～5週毎

身長 cm	体重 kg	体表面積 m^2	Cr mg/dl

TS-1(S-1)	BSA<1.25	20mg 4cp 2x(80mg/day)
	1.25≦BSA<1.5	25mg 4cp 2x(100mg/day)
	BSA≦1.5	20mg 6cp 2x(120mg/day)

80>Ccr≧60ml/minでは1段階減量、Ccr<60ml/minでは投与不可

Ccr = 体重(kg) x (140-年齢) / 72x Cr(mg/dl)
女性は0.85倍　Cr(日本での酵素法ではCr+0.2で計算する方がよい)

Day1～Day21	TS-1 内服	Day22～Day28～Day35	休薬(TS-1中止)

前日～Day 8　ソルデム1 500ml x1 Div 化学療法終了時までkeep　Main

Day8　イメンドカプセル(125)　1カプセル　抗がん剤投与1時間～1時間30分前に内服
Day9,10　イメンドカプセル(80)　1カプセル　朝食後内服

Day 8
(　/　)

8時00分 ソリューゲンF　500ml　側管
+ テルペラン(10mg)　1A　90分でDiv

9時30分 グラニセトロン(1mg) 1A + デキサート(6.6mg/2ml) 1V　側管
+ 生食　100ml　30分でDiv

10時00分 生食　500ml + メイロン7%(20ml)　1A　90分でDiv　側管

11時30分 ソリューゲンF　500ml　側管
+ テルペラン(10mg)　1A　90分でDiv

13時00分 シスプラチン (　　)mg/body + 生食300ml　120分でDiv　側管

15時00分 生食　500ml + メイロン7%(20ml)　1A　90分でDiv　側管

16時30分 ソリューゲンF　500ml　側管
+ ラシックス(20mg) 0.5A　90分でDiv

18時00分 マンニットール　300ml　60分でDiv　側管

18時30分 ソリューゲンF　500ml　側管
+ テルペラン(10mg)　1A　90分でDiv

(Main 残破棄、ヘパロック)

Day 9,10 (/)	9時30分 デキサート(6.6mg/2ml) 0.5V + 生食 100ml 30分でDiv	Main
	10時00分 ソリューゲンF 500ml 120分でDiv	Main
	12時00分 生食 500ml + メイロン7%(20ml) 1A 120分でDiv	Main
	14時00分 マンニットール 200ml 60分でDiv	Main
	14時30分 ソリューゲンF 500ml 120分でDiv	Main
	16時30分 終了 （ヘパロック）	Main