

治癒切除不能な進行・再発の胃がん FP+HER+Pemb療法

3週毎

薬剤・略号		商品名	投与量	投与日
シスプラチン	CDDP	シスプラチン	80 mg/m ²	Day1
フルオロウラシル	5-FU	5-FU	800 mg/m ²	Day1～5
トラスツズマブ	HER	ハーセプチン	初回;8 mg/kg	Day1
			2回目以降;6 mg/kg	Day1
ペムブロリズマブ	Pemb	キイトルーダ	200 mg/body	Day1

Day1

① ソルデム3A 500ml + 塩酸メトクロプラミド(10mg/2ml) 1A / 90min

② 生理食塩液 500ml + メイロン(7%20ml) 1A / 90min

③ アロカリス(235mg/10ml) 1v + グラニセトロンバッグ(1mg/50ml) 1P
+ デキサート(6.6mg/2ml) 1V / 30min

④ 生理食塩液 100ml / フラッシュ用

Y ⑤ ペムブロリズマブ 200mg/body + 生理食塩液50ml / 30min

0.2～5 μm以下のインラインフィルター付ルートを使用

Y ⑥ 生理食塩液 100ml / フラッシュ用 Y字から投与、バッグアダプタ使用

Y ⑦ トラスツズマブ ()mg/body + 注射用水+生理食塩液 250ml / 90min (初回)
トラスツズマブ ()mg/body + 注射用水 + 生理食塩液 100ml / 30min
(2回目以降)※

Y ⑧ 生理食塩液 100ml / フラッシュ用 Y字から投与、バッグアダプタ使用

Y ⑨ シスプラチン ()mg/body + 生理食塩液 300ml / 2hr

S 生理食塩液 100ml / Sルートプライミング用 バックアダプタ使用 (入院一般注射)

S ⑩ フルオロウラシル ()mg/body + 生理食塩液 500ml / 24hr 持続

⑪ 生理食塩液 500ml + メイロン(7%20ml) 1A / 90min


⑫ ソルデム3A 500ml + ラシックス(2mg/1ml) 1A / 90min

⑬ グラニセトロンバッグ(1mg/50ml) 1P / 30min

⑭ マンニトール 300ml / 60min

⑮ ソルデム3A 500ml + 塩酸メトクロプラミド(10mg/2ml) 1A / 90min

※ 初回は90分かけて投与。忍容性が良好であれば2回目以降は30分間100mlで投与可。



Day2,3

- ① デキサート(6.6mg/2ml) 1V + 生理食塩液 50ml / 15min
- ② ソルデム3A 500ml + 塩酸メクロプラミド(10mg/2ml) 1A / 90min
- ③ 生理食塩液 500ml + メイロン(7%20ml) 1A / 90min
- ④ マンニトール 300ml / 60min
- ⑤ ソルデム3A 500ml + 塩酸メクロプラミド(10mg/2ml) 1A / 90min

S ⑥ フルオロウラシル ()mg/body + 生理食塩液 500ml / 24hr 持続

Day4,5

S① フルオロウラシル ()mg/body + 生理食塩液 500ml / 24hr 持続

S 生理食塩液 100ml / Sルートフラッシュ用
バックアダプタ使用(一般注射で入力、最終日のみ)

【ルートを組み立て例】

Day2,3、Day4,5の抗
がん剤は5-FUのみ

