

| 肺ABCP  |                      |      |                 |
|--|----------------------|------|-----------------|
| 診療科名   | 呼吸器内科                |      | 投与スケジュール：3w/クール |
| 薬剤名  | 投与量                  | 投与方法 |                 |
| テセントリク   | 1200mg/body          | 点滴静注 | D1              |
| ペバシズマブBS   | 15mg/kg              | 点滴静注 | D1              |
| パクリタキセル  | 200mg/m <sup>2</sup> | 点滴静注 | D1              |
| カルボプラチン  | AUC6                 | 点滴静注 | D1              |
| ポララミン5mg(D1) ガスター20mg(D1) グラニセトロン1mg(D1)<br>デキサート19.8mg(D1) (内服)アブレヒタント(D1-3) デカドロン8mg/day(D2-4) |                      |      |                 |

| 胸腺腫ADOC   |                      |      |                 |
|---|----------------------|------|-----------------|
| 診療科名  | 外科                   |      | 投与スケジュール：3w/クール |
| 薬剤名   | 投与量                  | 投与方法 |                 |
| シスプラチン  | 50mg/m <sup>2</sup>  | 点滴静注 | D1              |
| ドキソルビシン   | 40mg/m <sup>2</sup>  | 点滴静注 | D1              |
| オンコビン   | 0.6mg/m <sup>2</sup> | 点滴静注 | D3              |
| エンドキサン  | 700mg/m <sup>2</sup> | 点滴静注 | D4              |
| パロノセトロン0.75mg(D1) デキサート6.6mg(D1)・3.3mg(D2-4)<br>(内服)アブレヒタント(D1-3) |                      |      |                 |

| 肺Ami+Laz (80kg以上 1回目)  |            |      |                 |
|--|------------|------|-----------------|
| 診療科名   | 呼吸器内科      |      | 投与スケジュール：4w/クール |
| 薬剤名  | 投与量        | 投与方法 |                 |
| ライブリバント  | 350mg      | 点滴静注 | D1              |
| ライブリバント  | 1050mg     | 点滴静注 | D2              |
| ライブリバント  | 1400mg     | 点滴静注 | D8,15,22        |
| ラズクルーズ   | 240mg/body | 経口   | 連日              |
| デキサート9.9mg(D1,2) ポララミン5mg(D1,2,8,15,22) ガスター20mg(D1,2,8,15,22)<br>アセリオ1000mg (D1,2,8,15,22)<br>(内服)エリキユース2.5mg 1回1錠 1日2回 (併用投与開始～4ヵ月間) |            |      |                 |

| 肺Ami+Laz (80kg以上 2回目以降)  |            |      |                 |
|--|------------|------|-----------------|
| 診療科名   | 呼吸器内科      |      | 投与スケジュール：4w/クール |
| 薬剤名  | 投与量        | 投与方法 |                 |
| ライブリバント  | 1400mg     | 点滴静注 | D1,15           |
| ラズクルーズ   | 240mg/body | 経口   | 連日              |
| ポララミン5mg(D1,15) ガスター20mg(D1,15)<br>アセリオ1000mg (D1,15)<br>(内服)エリキユース2.5mg 1回1錠 1日2回 (併用投与開始～4ヵ月間) |            |      |                 |

| 肺Ami+Laz (80kg未満 1回目)  |            |      |                 |
|--|------------|------|-----------------|
| 診療科名   | 呼吸器内科      |      | 投与スケジュール：4w/クール |
| 薬剤名  | 投与量        | 投与方法 |                 |
| ライブリバント  | 350mg      | 点滴静注 | D1              |
| ライブリバント  | 700mg      | 点滴静注 | D2              |
| ライブリバント  | 1050mg     | 点滴静注 | D8,15,22        |
| ラズクルーズ   | 240mg/body | 経口   | 連日              |
| デキサート9.9mg(D1,2) ポララミン5mg(D1,2,8,15,22) ガスター20mg(D1,2,8,15,22)<br>アセリオ1000mg (D1,2,8,15,22)<br>(内服)エリキユース2.5mg 1回1錠 1日2回 (併用投与開始～4ヵ月間) |            |      |                 |

| 肺Ami+Laz (80kg未満 2回目以降)  |            |      |                 |
|--|------------|------|-----------------|
| 診療科名   | 呼吸器内科      |      | 投与スケジュール：4w/クール |
| 薬剤名  | 投与量        | 投与方法 |                 |
| ライブリバント  | 1050mg     | 点滴静注 | D1,15           |
| ラズクルーズ   | 240mg/body | 経口   | 連日              |
| ポララミン5mg(D1,15) ガスター20mg(D1,15)<br>アセリオ1000mg (D1,15)<br>(内服)エリキユース2.5mg 1回1錠 1日2回 (投与開始～4ヵ月間) |            |      |                 |

| 肺AMR                              |                     |      |                 |
|-----------------------------------|---------------------|------|-----------------|
| 診療科名                              | 呼吸器内科               |      | 投与スケジュール：3w/クール |
| 薬剤名                               | 投与量                 | 投与方法 |                 |
| カルセド                              | 35mg/m <sup>2</sup> | 点滴静注 | D1-3            |
| グラニセトロン1mg(D1-3) デキサート6.6mg(D1-3) |                     |      |                 |

| 胸腺腫AMR+CBDCA   |                     |      |                 |
|--|---------------------|------|-----------------|
| 診療科名   | 呼吸器外科               |      | 投与スケジュール：3w/クール |
| 薬剤名  | 投与量                 | 投与方法 |                 |
| カルセド   | 30mg/m <sup>2</sup> | 点滴静注 | D1-3            |
| カルボプラチン  | AUC4                | 点滴静注 | D1              |
| グラニセトロン1mg(D1-3) デキサート9.9mg(D1)・6.6mg(D2-3)<br>(内服)アブレピタント(D1-3) |                     |      |                 |

| 肺Atezolizumab |             |      |                 |
|---------------|-------------|------|-----------------|
| 診療科名          | 呼吸器内科       |      | 投与スケジュール：3w/クール |
| 薬剤名           | 投与量         | 投与方法 |                 |
| テセントリク        | 1200mg/body | 点滴静注 | D1              |

| 肺Atezolizumab+BEV |             |      |                 |
|-------------------|-------------|------|-----------------|
| 診療科名              | 呼吸器内科       |      | 投与スケジュール：3w/クール |
| 薬剤名               | 投与量         | 投与方法 |                 |
| テセントリク            | 1200mg/body | 点滴静注 | D1              |
| ペバシズマブBS          | 15mg/kg     | 点滴静注 | D1              |

| 肺Atezolizumab+CBDCA+VP-16   |                      |      |                 |
|---|----------------------|------|-----------------|
| 診療科名  | 呼吸器内科                |      | 投与スケジュール：3w/クール |
| 薬剤名   | 投与量                  | 投与方法 |                 |
| テセントリク  | 1200mg/body          | 点滴静注 | D1              |
| カルボプラチン   | AUC5                 | 点滴静注 | D1              |
| エトポシド   | 100mg/m <sup>2</sup> | 点滴静注 | D1-3            |
| グラニセトロン1mg(D1) デキサート9.9mg(D1)・6.6mg(D2-3)<br>(内服)アブレピタント(D1-3) デカドロン8mg/day(D4) |                      |      |                 |

| 肺Bev     |         |      |                 |
|----------|---------|------|-----------------|
| 診療科名     | 外科      |      | 投与スケジュール：3w/クール |
| 薬剤名      | 投与量     | 投与方法 |                 |
| ペバシズマブBS | 15mg/kg | 点滴静注 | D1              |

| 肺Bev-PTX-CBDCA  |                      |      |                 |
|---|----------------------|------|-----------------|
| 診療科名  | 外科                   |      | 投与スケジュール：3w/クール |
| 薬剤名   | 投与量                  | 投与方法 |                 |
| パクリタキセル   | 200mg/m <sup>2</sup> | 点滴静注 | D1              |
| カルボプラチン   | AUC6                 | 点滴静注 | D1              |
| ペバシズマブBS  | 15mg/kg              | 点滴静注 | D1              |
| ガスター20mg(D1) グラニセトロン1mg(D1) デキサート19.8mg(D1)<br>(内服)レスタミン錠10mg 5錠(D1) アブレピタント(D1-3) デカドロン8mg/day(D2-4) |                      |      |                 |

| 胸腺腫CAMP   |                     |      |                 |
|---|---------------------|------|-----------------|
| 診療科名  | 外科                  |      | 投与スケジュール：3w/クール |
| 薬剤名   | 投与量                 | 投与方法 |                 |
| シスプラチン  | 20mg/m <sup>2</sup> | 点滴静注 | D1-4            |
| ドキソルピシン   | 40mg/m <sup>2</sup> | 点滴静注 | D1              |
| グラニセトロン1mg(D1-4) ソル・メドロール1000mg(D1-4)・500mg(D5-6) |                     |      |                 |

| 肺CBDCA |       |      |                 |
|--------|-------|------|-----------------|
| 診療科名   | 呼吸器内科 |      | 投与スケジュール：4w/クール |
| 薬剤名    | 投与量   | 投与方法 |                 |

|                                      |      |      |    |
|--------------------------------------|------|------|----|
| カルボプラチン                              | AUC5 | 点滴静注 | D1 |
| グラニセトロン1mg(D1) デキサート9.9mg(D1)        |      |      |    |
| (内服)アブレピタント(D1-3) デカドロン8mg/day(D2-4) |      |      |    |

|  |                     |      |                 |
|--|---------------------|------|-----------------|
| <b>肺CBDCA+CPT11</b>                        |                     |      |                 |
| 診療科名                                       | 呼吸器内科               |      | 投与スケジュール：4w/クール |
| 薬剤名  | 投与量                 | 投与方法 |                 |
| カルボプラチン                                    | AUC5                | 点滴静注 | D1              |
| イリノテカン                                     | 60mg/m <sup>2</sup> | 点滴静注 | D1,8,15         |
| グラニセトロン1mg(D1) デキサート9.9mg(D1)・6.6mg(D8,15) |                     |      |                 |
| (内服)アブレピタント(D1-3) デカドロン8mg/day(D2-4)       |                     |      |                 |

|                                      |                     |      |                 |
|--------------------------------------|---------------------|------|-----------------|
| <b>肺CBDCA+DTX+BEV</b>                |                     |      |                 |
| 診療科名                                 | 呼吸器内科               |      | 投与スケジュール：3w/クール |
| 薬剤名                                  | 投与量                 | 投与方法 |                 |
| ドセタキセル                               | 60mg/m <sup>2</sup> | 点滴静注 | D1              |
| カルボプラチン                              | AUC5                | 点滴静注 | D1              |
| ペバシズマブBS                             | 15mg/kg             | 点滴静注 | D1              |
| グラニセトロン1mg(D1) デキサート9.9mg(D1)        |                     |      |                 |
| (内服)アブレピタント(D1-3) デカドロン8mg/day(D2-4) |                     |      |                 |

|  |                      |      |                 |
|--|----------------------|------|-----------------|
| <b>肺CBDCA+nabPAC</b>                       |                      |      |                 |
| 診療科名                                       | 呼吸器内科                |      | 投与スケジュール：3w/クール |
| 薬剤名  | 投与量                  | 投与方法 |                 |
| アブラキサン                                     | 100mg/m <sup>2</sup> | 点滴静注 | D1,8,15         |
| カルボプラチン                                    | AUC5                 | 点滴静注 | D1              |
| グラニセトロン1mg(D1) デキサート9.9mg(D1)・6.6mg(D8,15) |                      |      |                 |
| (内服)アブレピタント(D1-3) デカドロン8mg/day(D2-4)       |                      |      |                 |

|  |                      |      |                 |
|--|----------------------|------|-----------------|
| <b>肺CBDCA+nabPAC+Atezo</b>                 |                      |      |                 |
| 診療科名                                       | 呼吸器内科                |      | 投与スケジュール：3w/クール |
| 薬剤名  | 投与量                  | 投与方法 |                 |
| テセントリク                                     | 1200mg/body          | 点滴静注 | D1              |
| アブラキサン                                     | 100mg/m <sup>2</sup> | 点滴静注 | D1,8,15         |
| カルボプラチン                                    | AUC6                 | 点滴静注 | D1              |
| グラニセトロン1mg(D1) デキサート9.9mg(D1)・6.6mg(D8,15) |                      |      |                 |
| (内服)アブレピタント(D1-3) デカドロン8mg/day(D2-4)       |                      |      |                 |

|  |                      |      |                 |
|--|----------------------|------|-----------------|
| <b>肺CBDCA+PEM+Ami (80kg以上 1回目)</b>   |                      |      |                 |
| 診療科名   | 内科                   |      | 投与スケジュール：3w/クール |
| 薬剤名  | 投与量                  | 投与方法 |                 |
| ペメトレキセド  | 500mg/m <sup>2</sup> | 点滴静注 | D1              |
| カルボプラチン  | AUC5                 | 点滴静注 | D1              |
| ライブリバント  | 350mg/body           | 点滴静注 | D1              |
| ライブリバント  | 1400mg/body          | 点滴静注 | D2              |
| ライブリバント  | 1750mg/body          | 点滴静注 | D8,15           |
| グラニセトロン1mg(D1) デキサート19.8mg(D1)・9.9mg(D2) ガスター20mg(D1,2,8,15)                               |                      |      |                 |
| ポララミン5mg(D1,2,8,15) アセリオ1000mg(D1,2,8,15)  |                      |      |                 |
| (内服)アブレピタント(D1-3) デカドロン8mg/day(D2-4) ペメトレキセド投与開始の1週間以上前にVB12 1mgを筋注(9週間ごと)バンピタン1g/dayを内服開始 |                      |      |                 |

|  |                      |      |                 |
|--|----------------------|------|-----------------|
| <b>肺CBDCA+PEM+Ami (80kg以上 2回目)</b>       |                      |      |                 |
| 診療科名                                     | 内科                   |      | 投与スケジュール：3w/クール |
| 薬剤名                                      | 投与量                  | 投与方法 |                 |
| ペメトレキセド                                  | 500mg/m <sup>2</sup> | 点滴静注 | D1              |
| カルボプラチン                                  | AUC5                 | 点滴静注 | D1              |
| ライブリバント                                  | 1750mg/body          | 点滴静注 | D1              |
| グラニセトロン1mg(D1) デキサート9.9mg(D1)            |                      |      |                 |
| ガスター20mg(D1) ポララミン5mg(D1) アセリオ1000mg(D1) |                      |      |                 |

(内服)アブレピタント(D1-3) デカドロン8mg/day(D2-4) ペメトレキセド投与開始の1週間以上前にVB12 1mgを筋注(9週間ごと)パンピタン1g/dayを内服開始

**肺CBDCA+PEM+Ami (80kg以上 3-4回目)**

|   |                      |      |                 |
|---|----------------------|------|-----------------|
| 診療科名  | 内科                   |      | 投与スケジュール：3w/クール |
| 薬剤名   | 投与量                  | 投与方法 |                 |
| ペメトレキセド   | 500mg/m <sup>2</sup> | 点滴静注 | D1              |
| カルボプラチン   | AUC5                 | 点滴静注 | D1              |
| ライブリバント   | 2100mg/body          | 点滴静注 | D1              |
| グラニセトロン1mg(D1) デキサート9.9mg(D1)<br>ガスター20mg(D1) ポララミン5mg(D1) アセリオ1000mg(D1)<br>(内服)アブレピタント(D1-3) デカドロン8mg/day(D2-4) ペメトレキセド投与開始の1週間以上前にVB12 1mgを筋注(9週間ごと)パンピタン1g/dayを内服開始 |                      |      |                 |

**肺CBDCA+PEM+Ami (80kg未満 1回目)**

|  |                      |      |                 |
|--|----------------------|------|-----------------|
| 診療科名   | 内科                   |      | 投与スケジュール：3w/クール |
| 薬剤名  | 投与量                  | 投与方法 |                 |
| ペメトレキセド  | 500mg/m <sup>2</sup> | 点滴静注 | D1              |
| カルボプラチン  | AUC5                 | 点滴静注 | D1              |
| ライブリバント  | 350mg/body           | 点滴静注 | D1              |
| ライブリバント  | 1050mg/body          | 点滴静注 | D2              |
| ライブリバント  | 1400mg/body          | 点滴静注 | D8,15           |
| グラニセトロン1mg(D1) デキサート19.8mg(D1)・9.9mg(D2) ガスター20mg(D1,2,8,15)<br>ポララミン5mg(D1,2,8,15) アセリオ1000mg(D1,2,8,15)<br>(内服)アブレピタント(D1-3) デカドロン8mg/day(D2-4) ペメトレキセド投与開始の1週間以上前にVB12 1mgを |                      |      |                 |

**肺CBDCA+PEM+Ami (80kg未満 2回目)**

|  |                      |      |                 |
|--|----------------------|------|-----------------|
| 診療科名   | 内科                   |      | 投与スケジュール：3w/クール |
| 薬剤名  | 投与量                  | 投与方法 |                 |
| ペメトレキセド  | 500mg/m <sup>2</sup> | 点滴静注 | D1              |
| カルボプラチン  | AUC5                 | 点滴静注 | D1              |
| ライブリバント  | 1400mg/body          | 点滴静注 | D1              |
| グラニセトロン1mg(D1) デキサート9.9mg(D1)<br>ガスター20mg(D1) ポララミン5mg(D1) アセリオ1000mg(D1)<br>(内服)アブレピタント(D1-3) デカドロン8mg/day(D2-4) ペメトレキセド投与開始の1週間以上前にVB12 1mgを |                      |      |                 |

**肺CBDCA+PEM+Ami (80kg未満 3-4回目)**

|  |                      |      |                 |
|--|----------------------|------|-----------------|
| 診療科名   | 内科                   |      | 投与スケジュール：3w/クール |
| 薬剤名  | 投与量                  | 投与方法 |                 |
| ペメトレキセド  | 500mg/m <sup>2</sup> | 点滴静注 | D1              |
| カルボプラチン  | AUC5                 | 点滴静注 | D1              |
| ライブリバント  | 1750mg/body          | 点滴静注 | D1              |
| グラニセトロン1mg(D1) デキサート9.9mg(D1)<br>ガスター20mg(D1) ポララミン5mg(D1) アセリオ1000mg(D1)<br>(内服)アブレピタント(D1-3) デカドロン8mg/day(D2-4) ペメトレキセド投与開始の1週間以上前にVB12 1mgを |                      |      |                 |

**肺CBDCA+PEM+Atezo**

|   |                      |      |                 |
|---|----------------------|------|-----------------|
| 診療科名  | 呼吸器内科                |      | 投与スケジュール：3w/クール |
| 薬剤名   | 投与量                  | 投与方法 |                 |
| テセントリク  | 1200mg/body          | 点滴静注 | D1              |
| ペメトレキセド   | 500mg/m <sup>2</sup> | 点滴静注 | D1              |
| カルボプラチン   | AUC6                 | 点滴静注 | D1              |
| グラニセトロン1mg(D1) デキサート9.9mg(D1)<br>(内服)アブレピタント(D1-3) デカドロン8mg/day(D2-4) ペメトレキセド投与開始の1週間以上前にVB12 1mgを筋注(9週間ごと)パンピタン1g/dayを内服開始 |                      |      |                 |

**肺CBDCA+PEM+BEV**

|      |       |      |                 |
|------|-------|------|-----------------|
| 診療科名 | 呼吸器内科 |      | 投与スケジュール：3w/クール |
| 薬剤名  | 投与量   | 投与方法 |                 |

|   |                      |      |    |
|---|----------------------|------|----|
| ペメトレキセド   | 500mg/m <sup>2</sup> | 点滴静注 | D1 |
| カルボプラチン   | AUC5                 | 点滴静注 | D1 |
| ペバシズマブBS  | 15mg/kg              | 点滴静注 | D1 |
| グラニセトロン1mg(D1) デキサート9.9mg(D1)<br>(内服)アブレピタント(D1-3) デカドロン8mg/day(D2-4) ペメトレキセド投与開始の1週間以上前にVB12 1mgを筋注(9週間ごと)パンピタン1g/dayを内服開始 |                      |      |    |

|   |                      |      |                 |
|---|----------------------|------|-----------------|
| <b>悪性胸膜中皮腫CBDCA+PEM+Pembro</b>  |                      |      |                 |
| 診療科名  | 呼吸器内科                |      | 投与スケジュール：3w/クール |
| 薬剤名   | 投与量                  | 投与方法 |                 |
| キイトルーダ  | 200mg/body           | 点滴静注 | D1              |
| ペメトレキセド   | 500mg/m <sup>2</sup> | 点滴静注 | D1              |
| カルボプラチン   | AUC6                 | 点滴静注 | D1              |
| グラニセトロン1mg(D1) デキサート9.9mg(D1)<br>(内服)アブレピタント(D1-3) デカドロン8mg/day(D2-4) ペメトレキセド投与開始の1週間以上前にVB12 1mgを筋注(9週間ごと)パンピタン1g/dayを内服開始 |                      |      |                 |

|  |                     |      |                  |
|--|---------------------|------|------------------|
| <b>肺CBDCA+PTX (Rt併用あり)</b>   |                     |      |                  |
| 診療科名   | 呼吸器内科               |      | 投与スケジュール：9w/クール  |
| 薬剤名  | 投与量                 | 投与方法 |                  |
| パクリタキセル  | 40mg/m <sup>2</sup> | 点滴静注 | D1,8,15,22,29,36 |
| カルボプラチン  | AUC2                | 点滴静注 | D1,8,15,22,29,36 |
| ポラミン5mg(D1,8,15,22,29,36)、 ガスター20mg(D1,8,15,22,29,36)<br>グラニセトロン1mg(D1,8,15,22,29,36) デキサート6.6mg(D1,8,15,22,29,36) |                     |      |                  |

|  |                     |      |                 |
|--|---------------------|------|-----------------|
| <b>肺CBDCA+w-PTX (Rt併用なし)</b>   |                     |      |                 |
| 診療科名   | 呼吸器内科               |      | 投与スケジュール：4w/クール |
| 薬剤名  | 投与量                 | 投与方法 |                 |
| パクリタキセル  | 70mg/m <sup>2</sup> | 点滴静注 | D1,8,15         |
| カルボプラチン  | AUC5                | 点滴静注 | D1              |
| ポラミン5mg(D1,8,15) ガスター20mg(D1,8,15) グラニセトロン1mg(D1,8,15) デキサート9.9mg(D1)・6.6mg(D8,15) |                     |      |                 |

|  |                     |      |                 |
|--|---------------------|------|-----------------|
| <b>肺CBDCA+TS-1</b>   |                     |      |                 |
| 診療科名   | 呼吸器内科               |      | 投与スケジュール：3w/クール |
| 薬剤名  | 投与量                 | 投与方法 |                 |
| カルボプラチン  | AUC5                | 点滴静注 | D1              |
| TS-1   | 80mg/m <sup>2</sup> | 経口   | D1-14           |
| グラニセトロン1mg(D1) デキサート9.9mg(D1)<br>(内服)アブレピタント(D1-3) デカドロン8mg/day(D2-4) TS-1 体表面積<1.25m <sup>2</sup> ：80mg/day 1.25~1.5m <sup>2</sup> ：100mg/day 1.5m <sup>2</sup> <：120mg/day |                     |      |                 |

|   |                      |      |                 |
|---|----------------------|------|-----------------|
| <b>肺CBDCA+VP-16</b>   |                      |      |                 |
| 診療科名  | 呼吸器内科                |      | 投与スケジュール：4w/クール |
| 薬剤名   | 投与量                  | 投与方法 |                 |
| カルボプラチン   | AUC5                 | 点滴静注 | D1              |
| エトボシド   | 100mg/m <sup>2</sup> | 点滴静注 | D1-3            |
| グラニセトロン1mg(D1) デキサート9.9mg(D1)・6.6mg(D2-3)<br>(内服)アブレピタント(D1-3) デカドロン8mg/day(D4) |                      |      |                 |

|   |                     |      |                 |
|---|---------------------|------|-----------------|
| <b>肺CDDP+CPT11</b>  |                     |      |                 |
| 診療科名  | 呼吸器内科               |      | 投与スケジュール：4w/クール |
| 薬剤名   | 投与量                 | 投与方法 |                 |
| イリノテカン  | 60mg/m <sup>2</sup> | 点滴静注 | D1,8,15         |
| シスプラチン  | 60mg/m <sup>2</sup> | 点滴静注 | D1              |
| グラニセトロン1mg(D1,8,15) デキサート9.9mg(D1)・6.6mg(D8,15)<br>(内服)アブレピタント(D1-3) デカドロン8mg/day(D2-4) |                     |      |                 |

|                  |       |  |                 |
|------------------|-------|--|-----------------|
| <b>肺CDDP+DTX</b> |       |  |                 |
| 診療科名             | 呼吸器内科 |  | 投与スケジュール：3w/クール |

| 薬剤名  | 投与量                 | 投与方法 |    |
|--|---------------------|------|----|
| ドセタキセル   | 60mg/m <sup>2</sup> | 点滴静注 | D1 |
| シスプラチン   | 80mg/m <sup>2</sup> | 点滴静注 | D1 |
| グラニセロン1mg(D1) デキサート9.9mg(D1)<br>(内服)アブレピタント(D1-3) デカドロン8mg/day(D2-4) |                     |      |    |

| 肺CDDP+GEM  |                       |      |                 |
|--|-----------------------|------|-----------------|
| 診療科名   | 呼吸器内科                 |      | 投与スケジュール：3w/クール |
| 薬剤名  | 投与量                   | 投与方法 |                 |
| ゲムシタビン   | 1000mg/m <sup>2</sup> | 点滴静注 | D1,8            |
| シスプラチン   | 80mg/m <sup>2</sup>   | 点滴静注 | D1              |
| グラニセロン1mg(D1) デキサート9.9mg(D1)・6.6mg(D8)<br>(内服)アブレピタント(D1-3) デカドロン8mg/day(D2-4) |                       |      |                 |

| 肺CDDP+GEM+Necitumumab  |                       |      |                 |
|--|-----------------------|------|-----------------|
| 診療科名   | 呼吸器内科                 |      | 投与スケジュール：3w/クール |
| 薬剤名  | 投与量                   | 投与方法 |                 |
| ポートルーザ   | 800mg/m <sup>2</sup>  | 点滴静注 | D1,8            |
| ゲムシタビン   | 1250mg/m <sup>2</sup> | 点滴静注 | D1,8            |
| シスプラチン   | 75mg/m <sup>2</sup>   | 点滴静注 | D1              |
| グラニセロン1mg(D1) デキサート9.9mg(D1)・6.6mg(D8)<br>(内服)アブレピタント(D1-3) デカドロン8mg/day(D2-4) |                       |      |                 |

| 肺CDDP+PEME   |                      |      |                 |
|--|----------------------|------|-----------------|
| 診療科名   | 呼吸器内科                |      | 投与スケジュール：3w/クール |
| 薬剤名  | 投与量                  | 投与方法 |                 |
| ペメトレキシド  | 500mg/m <sup>2</sup> | 点滴静注 | D1              |
| シスプラチン   | 75mg/m <sup>2</sup>  | 点滴静注 | D1              |
| グラニセロン1mg(D1) デキサート9.9mg(D1)<br>(内服)アブレピタント(D1-3) デカドロン8mg/day(D2-4) ペメトレキシド投与開始の1週間以上前にVB12 1mgを筋注(9週間ごと)バンピタン1g/dayを内服開始 |                      |      |                 |

| 肺CDDP+PEM+Atezo   |                      |      |                 |
|---|----------------------|------|-----------------|
| 診療科名  | 呼吸器内科                |      | 投与スケジュール：3w/クール |
| 薬剤名   | 投与量                  | 投与方法 |                 |
| テセントリク  | 1200mg/body          | 点滴静注 | D1              |
| ペメトレキシド   | 500mg/m <sup>2</sup> | 点滴静注 | D1              |
| シスプラチン  | 75mg/m <sup>2</sup>  | 点滴静注 | D1              |
| パロノセロン0.75mg(D1) デキサート9.9mg(D1)<br>(内服)アブレピタント(D1-3) デカドロン8mg/day(D2-4) ペメトレキシド投与開始の1週間以上前にVB12 1mgを筋注(9週間ごと)バンピタン1g/dayを内服開始 |                      |      |                 |

| 肺CDDP+PEM+BEV  |                      |      |                 |
|--|----------------------|------|-----------------|
| 診療科名   | 呼吸器内科                |      | 投与スケジュール：3w/クール |
| 薬剤名  | 投与量                  | 投与方法 |                 |
| ベバシズマブBS   | 15mg/kg              | 点滴静注 | D1              |
| ペメトレキシド  | 500mg/m <sup>2</sup> | 点滴静注 | D1              |
| シスプラチン   | 75mg/m <sup>2</sup>  | 点滴静注 | D1              |
| グラニセロン1mg(D1) デキサート9.9mg(D1)<br>(内服)アブレピタント(D1-3) デカドロン8mg/day(D2-4) ペメトレキシド投与開始の1週間以上前にVB12 1mgを筋注(9週間ごと)バンピタン1g/dayを内服開始 |                      |      |                 |

| 悪性胸膜中皮腫CDDP+PEM+Pembro       |                      |      |                 |
|------------------------------|----------------------|------|-----------------|
| 診療科名                         | 呼吸器内科                |      | 投与スケジュール：3w/クール |
| 薬剤名                          | 投与量                  | 投与方法 |                 |
| キイトルーダ                       | 200mg/body           | 点滴静注 | D1              |
| ペメトレキシド                      | 500mg/m <sup>2</sup> | 点滴静注 | D1              |
| シスプラチン                       | 75mg/m <sup>2</sup>  | 点滴静注 | D1              |
| グラニセロン1mg(D1) デキサート9.9mg(D1) |                      |      |                 |

(内服)アブレピタント(D1-3) デカドロン8mg/day(D2-4) ペメトレキセド投与開始の1週間以上前にVB12 1mgを筋注(9週間ごと)パンピタン1g/dayを内服開始

#### 肺CDDP+S1+RT

|   |                     |      |                 |
|---|---------------------|------|-----------------|
| 診療科名  | 呼吸器内科               |      | 投与スケジュール：4w/クール |
| 薬剤名   | 投与量                 | 投与方法 |                 |
| シスプラチン  | 60mg/m <sup>2</sup> | 点滴静注 | D1              |
| TS-1  | 80mg/m <sup>2</sup> | 経口   | D1-14           |
| グラニセトン1mg(D1) デキサート9.9mg(D1)  |                     |      |                 |
| (内服)アブレピタント(D1-3) デカドロン8mg/day(D2-4) TS-1 体表面積<1.25㎡：80mg/day 1.25~1.5㎡：100mg/day 1.5㎡<：120mg/day |                     |      |                 |

#### 肺CDDP+TS-1

|   |                     |      |                 |
|---|---------------------|------|-----------------|
| 診療科名  | 呼吸器内科               |      | 投与スケジュール：4w/クール |
| 薬剤名   | 投与量                 | 投与方法 |                 |
| シスプラチン  | 60mg/m <sup>2</sup> | 点滴静注 | D8              |
| TS-1  | 80mg/m <sup>2</sup> | 経口   | D1-21           |
| グラニセトン1mg(D1) デキサート9.9mg(D1)  |                     |      |                 |
| (内服)アブレピタント(D8-10) TS-1 体表面積<1.25㎡：80mg/day 1.25~1.5㎡：100mg/day 1.5㎡<：120mg/day |                     |      |                 |

#### 肺CDDP+VNR (Rx併用あり)

|                                      |                     |      |                 |
|--------------------------------------|---------------------|------|-----------------|
| 診療科名                                 | 呼吸器内科               |      | 投与スケジュール：4w/クール |
| 薬剤名                                  | 投与量                 | 投与方法 |                 |
| ロゼウス                                 | 20mg/m <sup>2</sup> | 点滴静注 | D1,8            |
| シスプラチン                               | 80mg/m <sup>2</sup> | 点滴静注 | D1              |
| グラニセトン1mg(D1) デキサート9.9mg(D1)         |                     |      |                 |
| (内服)アブレピタント(D1-3) デカドロン8mg/day(D2-4) |                     |      |                 |

#### 肺CDDP+VNR (Rx併用なし)

|                                      |                     |      |                 |
|--------------------------------------|---------------------|------|-----------------|
| 診療科名                                 | 呼吸器内科               |      | 投与スケジュール：3w/クール |
| 薬剤名                                  | 投与量                 | 投与方法 |                 |
| ロゼウス                                 | 25mg/m <sup>2</sup> | 点滴静注 | D1,8            |
| シスプラチン                               | 80mg/m <sup>2</sup> | 点滴静注 | D1              |
| グラニセトン1mg(D1) デキサート9.9mg(D1)         |                     |      |                 |
| (内服)アブレピタント(D1-3) デカドロン8mg/day(D2-4) |                     |      |                 |

#### 肺CDDP+VP-16

|  |                      |      |                 |
|--|----------------------|------|-----------------|
| 診療科名                                     | 呼吸器内科                |      | 投与スケジュール：3w/クール |
| 薬剤名                                      | 投与量                  | 投与方法 |                 |
| エトポシド                                    | 100mg/m <sup>2</sup> | 点滴静注 | D1-3            |
| シスプラチン                                   | 80mg/m <sup>2</sup>  | 点滴静注 | D1              |
| グラニセトン1mg(D1) デキサート9.9mg(D1)・6.6mg(D2-3) |                      |      |                 |
| (内服)アブレピタント(D1-3) デカドロン8mg/day(D4)       |                      |      |                 |

#### 肺CPT-11

|  |                      |      |                 |
|--|----------------------|------|-----------------|
| 診療科名                                   | 呼吸器内科                |      | 投与スケジュール：4w/クール |
| 薬剤名                                    | 投与量                  | 投与方法 |                 |
| イリノテカン                                 | 100mg/m <sup>2</sup> | 点滴静注 | D1,8,15         |
| グラニセトン1mg(D1,8,15) デキサート6.6mg(D1,8,15) |                      |      |                 |

#### 肺CPT-11+TS-1

|  |                     |      |                 |
|--|---------------------|------|-----------------|
| 診療科名   | 呼吸器内科               |      | 投与スケジュール：4w/クール |
| 薬剤名  | 投与量                 | 投与方法 |                 |
| イリノテカン   | 60mg/m <sup>2</sup> | 点滴静注 | D1,8            |
| TS-1   | 80mg/m <sup>2</sup> | 経口   | D1-14           |
| グラニセトン1mg(D1,8) デキサート6.6mg(D1,8)                                 |                     |      |                 |
| (内服)TS-1 体表面積<1.25㎡：80mg/day 1.25~1.5㎡：100mg/day 1.5㎡<：120mg/day |                     |      |                 |
| 投与基準   |                     |      |                 |

| 肺daily CBDCA+RT       |                     |      |                       |
|-----------------------|---------------------|------|-----------------------|
| 診療科名                  | 呼吸器内科               |      | 投与スケジュール：4w/クール       |
| 薬剤名                   | 投与量                 | 投与方法 |                       |
| カルボプラチン               | 30mg/m <sup>2</sup> | 点滴静注 | D1-5,8-12,15-19,22-26 |
| 放射線治療60Gy/30回（6週間）と併用 |                     |      |                       |

| 肺DTX                          |                     |      |                 |
|-------------------------------|---------------------|------|-----------------|
| 診療科名                          | 外科                  |      | 投与スケジュール：3w/クール |
| 薬剤名                           | 投与量                 | 投与方法 |                 |
| ドセタキセル                        | 60mg/m <sup>2</sup> | 点滴静注 | D1              |
| グラニセトロン1mg(D1) デキサート6.6mg(D1) |                     |      |                 |

| 肺DTX+BEV       |                     |      |                 |
|----------------|---------------------|------|-----------------|
| 診療科名           | 呼吸器内科               |      | 投与スケジュール：3w/クール |
| 薬剤名            | 投与量                 | 投与方法 |                 |
| ペバシズマブBS       | 15mg/kg             | 点滴静注 | D1              |
| ドセタキセル         | 60mg/m <sup>2</sup> | 点滴静注 | D1              |
| デキサート6.6mg(D1) |                     |      |                 |

| 肺DTX+CBDCA                           |                     |      |                 |
|--------------------------------------|---------------------|------|-----------------|
| 診療科名                                 | 呼吸器内科               |      | 投与スケジュール：4w/クール |
| 薬剤名                                  | 投与量                 | 投与方法 |                 |
| ドセタキセル                               | 70mg/m <sup>2</sup> | 点滴静注 | D1              |
| カルボプラチン                              | AUC5                | 点滴静注 | D1              |
| グラニセトロン1mg(D1) デキサート9.9mg(D1)        |                     |      |                 |
| (内服)アプレピタント(D1-3) デカドロン8mg/day(D2-4) |                     |      |                 |

| 肺Durvalumab NSCLC（ケモラジ後）30kg以上 |             |      |                 |
|--------------------------------|-------------|------|-----------------|
| 診療科名                           | 呼吸器内科       |      | 投与スケジュール：4w/クール |
| 薬剤名                            | 投与量         | 投与方法 |                 |
| イミフィンジ                         | 1500mg/body | 点滴静注 | D1              |

| 肺Durvalumab NSCLC（ケモラジ後）30kg以下 |         |      |                 |
|--------------------------------|---------|------|-----------------|
| 診療科名                           | 呼吸器内科   |      | 投与スケジュール：4w/クール |
| 薬剤名                            | 投与量     | 投与方法 |                 |
| イミフィンジ                         | 20mg/kg | 点滴静注 | D1              |

| 肺Durvalumab SCLC（ケモラジ後）30kg以上 |             |      |                 |
|-------------------------------|-------------|------|-----------------|
| 診療科名                          | 呼吸器内科       |      | 投与スケジュール：4w/クール |
| 薬剤名                           | 投与量         | 投与方法 |                 |
| イミフィンジ                        | 1500mg/body | 点滴静注 | D1              |

| 肺Durvalumab SCLC（ケモラジ後）30kg以下 |         |      |                 |
|-------------------------------|---------|------|-----------------|
| 診療科名                          | 呼吸器内科   |      | 投与スケジュール：4w/クール |
| 薬剤名                           | 投与量     | 投与方法 |                 |
| イミフィンジ                        | 20mg/kg | 点滴静注 | D1              |

| 肺Durvalumab（維持療法用）30kg以上 |             |      |                 |
|--------------------------|-------------|------|-----------------|
| 診療科名                     | 呼吸器内科       |      | 投与スケジュール：4w/クール |
| 薬剤名                      | 投与量         | 投与方法 |                 |
| イミフィンジ                   | 1500mg/body | 点滴静注 | D1              |

| 肺Durvalumab（維持療法用）30kg以下 |         |      |                 |
|--------------------------|---------|------|-----------------|
| 診療科名                     | 呼吸器内科   |      | 投与スケジュール：4w/クール |
| 薬剤名                      | 投与量     | 投与方法 |                 |
| イミフィンジ                   | 20mg/kg | 点滴静注 | D1              |

| 肺Durvalumab（術後） |         |      |    |
|-----------------|---------|------|----|
| 診療科名            |         |      |    |
| 薬剤名             | 投与量     | 投与方法 |    |
| イミフィンジ          | 20mg/kg | 点滴静注 | D1 |

|        |             |      |                 |
|--------|-------------|------|-----------------|
| 診療科名   | 呼吸器外科       |      | 投与スケジュール：4w/クール |
| 薬剤名    | 投与量         | 投与方法 |                 |
| イミフィンジ | 1500mg/body | 点滴静注 | D1              |

|   |                      |      |                 |
|---|----------------------|------|-----------------|
| <b>肺Durvalumab+CBDCA+VP-16</b>  |                      |      |                 |
| 診療科名  | 呼吸器内科                |      | 投与スケジュール：3w/クール |
| 薬剤名   | 投与量                  | 投与方法 |                 |
| イミフィンジ  | 1500mg/body          | 点滴静注 | D1              |
| カルボプラチン   | AUC6                 | 点滴静注 | D1              |
| エトポシド   | 100mg/m <sup>2</sup> | 点滴静注 | D1-3            |
| グラニセトロン1mg(D1) デキサート9.9mg(D1)・6.6mg(D2-3)<br>(内服)アブレピタント(D1-3) デカドロン8mg/day(D4) |                      |      |                 |

|  |                       |      |                 |
|--|-----------------------|------|-----------------|
| <b>肺Durvalumab+CBDCA+GEM (術前)</b>  |                       |      |                 |
| 診療科名   | 呼吸器外科                 |      | 投与スケジュール：3w/クール |
| 薬剤名  | 投与量                   | 投与方法 |                 |
| イミフィンジ   | 1500mg/body           | 点滴静注 | D1              |
| ゲムシタビン   | 1000mg/m <sup>2</sup> | 点滴静注 | D1,8            |
| カルボプラチン  | AUC5                  | 点滴静注 | D1              |
| グラニセトロン1mg(D1) デキサート9.9mg(D1) デキサート6.6mg(D8)<br>(内服)アブレピタント(D1-3) デカドロン8mg/day(D2-4) |                       |      |                 |

|  |                      |      |                 |
|--|----------------------|------|-----------------|
| <b>肺Durvalumab+CBDCA+PEM (術前)</b>  |                      |      |                 |
| 診療科名   | 呼吸器外科                |      | 投与スケジュール：3w/クール |
| 薬剤名  | 投与量                  | 投与方法 |                 |
| イミフィンジ   | 1500mg/body          | 点滴静注 | D1              |
| ペメトレキシド  | 500mg/m <sup>2</sup> | 点滴静注 | D1              |
| カルボプラチン  | AUC5                 | 点滴静注 | D1              |
| グラニセトロン1mg(D1) デキサート9.9mg(D1)<br>(内服)アブレピタント(D1-3) デカドロン8mg/day(D2-4) ペメトレキシド投与開始の1週間以上前にVB12 1mgを筋注(9週間ごと) パンピタン1g/dayを内服開始 |                      |      |                 |

|  |                      |      |                 |
|--|----------------------|------|-----------------|
| <b>肺Durvalumab+CBDCA+PTX (術前)</b>  |                      |      |                 |
| 診療科名   | 呼吸器外科                |      | 投与スケジュール：3w/クール |
| 薬剤名  | 投与量                  | 投与方法 |                 |
| イミフィンジ   | 1500mg/body          | 点滴静注 | D1              |
| パクリタキセル  | 200mg/m <sup>2</sup> | 点滴静注 | D1              |
| カルボプラチン  | AUC6                 | 点滴静注 | D1              |
| グラニセトロン1mg(D1) デキサート19.8mg(D1) ガスター20mg (D1) ポララミン5mg (D1)<br>(内服)アブレピタント(D1-3) デカドロン8mg/day(D2-4) |                      |      |                 |

|   |                      |      |                 |
|---|----------------------|------|-----------------|
| <b>肺Durvalumab+CDDP+VP-16</b>   |                      |      |                 |
| 診療科名  | 呼吸器内科                |      | 投与スケジュール：3w/クール |
| 薬剤名   | 投与量                  | 投与方法 |                 |
| イミフィンジ  | 1500mg/body          | 点滴静注 | D1              |
| エトポシド   | 100mg/m <sup>2</sup> | 点滴静注 | D1-3            |
| シスプラチン  | 80mg/m <sup>2</sup>  | 点滴静注 | D1              |
| グラニセトロン1mg(D1) デキサート9.9mg(D1)・6.6mg(D2-3)<br>(内服)アブレピタント(D1-3) デカドロン8mg/day(D4) |                      |      |                 |

|  |                       |      |                 |
|--|-----------------------|------|-----------------|
| <b>肺Durvalumab+CDDP+GEM (術前)</b>   |                       |      |                 |
| 診療科名   | 呼吸器外科                 |      | 投与スケジュール：3w/クール |
| 薬剤名  | 投与量                   | 投与方法 |                 |
| イミフィンジ   | 1500mg/body           | 点滴静注 | D1              |
| ゲムシタビン   | 1000mg/m <sup>2</sup> | 点滴静注 | D1,8            |
| シスプラチン   | 75mg/m <sup>2</sup>   | 点滴静注 | D1              |
| グラニセトロン1mg(D1) デキサート9.9mg(D1) デキサート6.6mg(D8)<br>(内服)アブレピタント(D1-3) デカドロン8mg/day(D2-4) |                       |      |                 |

| 肺Durvalumab+CDDP+PEM (術前)  |                      |      |                 |
|--|----------------------|------|-----------------|
| 診療科名   | 呼吸器外科                |      | 投与スケジュール：3w/クール |
| 薬剤名  | 投与量                  | 投与方法 |                 |
| イミフィンジ   | 1500mg/body          | 点滴静注 | D1              |
| ペメトレキセド  | 500mg/m <sup>2</sup> | 点滴静注 | D1              |
| シスプラチン   | 75mg/m <sup>2</sup>  | 点滴静注 | D1              |
| グラニセトロン1mg(D1) デキサート9.9mg(D1)<br>(内服)アブレピタント(D1-3) デカドロン8mg/day(D2-4) ペメトレキセド投与開始の1週間以上前にVB12 1mgを筋注(9週間ごと) パンピタン1g/dayを内服開始 |                      |      |                 |

| 肺Durva+Tremeli+CBDCA+nabPAC (1-4回目)                                   |                      |      |                 |
|---|----------------------|------|-----------------|
| 診療科名  | 呼吸器外科                |      | 投与スケジュール：3w/クール |
| 薬剤名   | 投与量                  | 投与方法 |                 |
| イジユド  | 75mg/body            | 点滴静注 | D1              |
| イミフィンジ  | 1500mg/body          | 点滴静注 | D1              |
| アブラキサン  | 100mg/m <sup>2</sup> | 点滴静注 | D1,8,15         |
| カルボプラチン   | AUC6                 | 点滴静注 | D1              |
| グラニセトロン1mg(D1) デキサート9.9mg(D1)<br>(内服)アブレピタント(D1-3) デカドロン8mg/day(D2-4) |                      |      |                 |

| 肺Durva+Tremeli (維持1回目)            |             |      |                 |
|-----------------------------------|-------------|------|-----------------|
| 診療科名                              | 呼吸器外科       |      | 投与スケジュール：8w/クール |
| 薬剤名                               | 投与量         | 投与方法 |                 |
| イミフィンジ                            | 1500mg/body | 点滴静注 | D1,29           |
| イジユド                              | 75mg/body   | 点滴静注 | D29             |
| 肺Durva+Tremeli+CBDCA+nabPAC後の維持療法 |             |      |                 |

| 肺Durva+Tremeli (維持2回目以降)          |             |      |                 |
|-----------------------------------|-------------|------|-----------------|
| 診療科名                              | 呼吸器外科       |      | 投与スケジュール：4w/クール |
| 薬剤名                               | 投与量         | 投与方法 |                 |
| イミフィンジ                            | 1500mg/body | 点滴静注 | D1              |
| 肺Durva+Tremeli+CBDCA+nabPAC後の維持療法 |             |      |                 |

| 肺Durva+Tremeli+CBDCA+PEM (1-4回目)   |                      |      |                 |
|--|----------------------|------|-----------------|
| 診療科名   | 呼吸器外科                |      | 投与スケジュール：3w/クール |
| 薬剤名  | 投与量                  | 投与方法 |                 |
| イジユド   | 75mg/body            | 点滴静注 | D1              |
| イミフィンジ   | 1500mg/body          | 点滴静注 | D1              |
| ペメトレキセド  | 500mg/m <sup>2</sup> | 点滴静注 | D1              |
| カルボプラチン  | AUC6                 | 点滴静注 | D1              |
| グラニセトロン1mg(D1) デキサート9.9mg(D1)<br>(内服)アブレピタント(D1-3) デカドロン8mg/day(D2-4) ペメトレキセド投与開始の1週間以上前にVB12 1mgを筋注(9週間ごと) パンピタン1g/dayを内服開始 |                      |      |                 |

| 肺Durva+Tremeli+CDDP+PEM (1-4回目)  |                      |      |                 |
|--|----------------------|------|-----------------|
| 診療科名   | 呼吸器外科                |      | 投与スケジュール：3w/クール |
| 薬剤名  | 投与量                  | 投与方法 |                 |
| イジユド   | 75mg/body            | 点滴静注 | D1              |
| イミフィンジ   | 1500mg/body          | 点滴静注 | D1              |
| ペメトレキセド  | 500mg/m <sup>2</sup> | 点滴静注 | D1              |
| シスプラチン   | 75mg/m <sup>2</sup>  | 点滴静注 | D1              |
| グラニセトロン1mg(D1) デキサート9.9mg(D1)<br>(内服)アブレピタント(D1-3) デカドロン8mg/day(D2-4) ペメトレキセド投与開始の1週間以上前にVB12 1mgを筋注(9週間ごと) パンピタン1g/dayを内服開始 |                      |      |                 |

| 肺Durva+Tremeli+PEM (維持1回目) |             |      |                 |
|----------------------------|-------------|------|-----------------|
| 診療科名                       | 呼吸器外科       |      | 投与スケジュール：8w/クール |
| 薬剤名                        | 投与量         | 投与方法 |                 |
| イミフィンジ                     | 1500mg/body | 点滴静注 | D1,29           |

|  |                      |      |       |
|--|----------------------|------|-------|
| ペメトレキセド  | 500mg/m <sup>2</sup> | 点滴静注 | D1,29 |
| イジユド   | 75mg/body            | 点滴静注 | D29   |
| 肺Durva+Tremeli+CBDCA or CDDP+PEM後の維持療法<br>デキサート6.6mg(D1,29)<br>(内服)デカドロン8mg/day(D2-3,D30-31) ペメトレキセド投与開始の1週間以上前にVB12 1mgを筋注(9週間ごと)<br>パンピタン1g/dayを内服開始 |                      |      |       |

|   |                      |      |                 |
|---|----------------------|------|-----------------|
| <b>肺Durva+Tremeli+PEM (維持2回目以降)</b>   |                      |      |                 |
| 診療科名  | 呼吸器外科                |      | 投与スケジュール：4w/クール |
| 薬剤名   | 投与量                  | 投与方法 |                 |
| イミフィンジ  | 1500mg/body          | 点滴静注 | D1              |
| ペメトレキセド   | 500mg/m <sup>2</sup> | 点滴静注 | D1              |
| 肺Durva+Tremeli+CBDCA or CDDP+PEM後の維持療法<br>デキサート6.6mg(D1)<br>(内服)デカドロン8mg/day(D2-3) ペメトレキセド投与開始の1週間以上前にVB12 1mgを筋注(9週間ごと) パンピタン1g/dayを内服開始 |                      |      |                 |

|                       |           |      |                 |
|-----------------------|-----------|------|-----------------|
| <b>肺Erlotinib+BEV</b> |           |      |                 |
| 診療科名                  | 呼吸器内科     |      | 投与スケジュール：3w/クール |
| 薬剤名                   | 投与量       | 投与方法 |                 |
| ペバシズマブBS              | 15mg/kg   | 点滴静注 | D1              |
| タルセバ                  | 150mg/day | 経口   | D1-21           |

|  |         |      |                 |
|--|---------|------|-----------------|
| <b>肺EGFR+RAM</b>   |         |      |                 |
| 診療科名   | 呼吸器内科   |      | 投与スケジュール：2w/クール |
| 薬剤名  | 投与量     | 投与方法 |                 |
| サイラムザ  | 10mg/kg | 点滴静注 | D1              |
| EGFR   | 下記参照    | 経口   | D1-14           |
| ポララミン5mg(D1)<br>(内服)EGFR：タルセバ(150mg/day)またはゲフィチニブ(250mg/day)のいずれかを内服 |         |      |                 |

|   |                       |      |                 |
|---|-----------------------|------|-----------------|
| <b>肺GEM</b>                             |                       |      |                 |
| 診療科名                                    | 呼吸器内科                 |      | 投与スケジュール：4w/クール |
| 薬剤名                                     | 投与量                   | 投与方法 |                 |
| ゲムシタピン                                  | 1000mg/m <sup>2</sup> | 点滴静注 | D1,8,15         |
| グラニセトロン1mg(D1,8,15) デキサート6.6mg(D1,8,15) |                       |      |                 |

|   |                       |      |                 |
|---|-----------------------|------|-----------------|
| <b>肺GEM-CBDCA</b>   |                       |      |                 |
| 診療科名  | 外科                    |      | 投与スケジュール：4w/クール |
| 薬剤名   | 投与量                   | 投与方法 |                 |
| ゲムシタピン  | 1000mg/m <sup>2</sup> | 点滴静注 | D1,8            |
| カルボプラチン   | AUC5                  | 点滴静注 | D1              |
| グラニセトロン1mg(D1) デキサート9.9mg(D1)・6.6mg(D8)<br>(内服)アプレピタント(D1-3) デカドロン8mg/day(D2-4) |                       |      |                 |

|                     |                      |      |                 |
|---------------------|----------------------|------|-----------------|
| <b>肺nabPAC単剤</b>    |                      |      |                 |
| 診療科名                | 呼吸器内科                |      | 投与スケジュール：4w/クール |
| 薬剤名                 | 投与量                  | 投与方法 |                 |
| アブラキサン              | 100mg/m <sup>2</sup> | 点滴静注 | D1,8,15         |
| グラニセトロン1mg(D1,8,15) |                      |      |                 |

|   |                      |      |                 |
|---|----------------------|------|-----------------|
| <b>肺Necitumumab (維持療法)</b>                        |                      |      |                 |
| 診療科名  | 呼吸器内科                |      | 投与スケジュール：3w/クール |
| 薬剤名   | 投与量                  | 投与方法 |                 |
| ポートラーザ  | 800mg/m <sup>2</sup> | 点滴静注 | D1,8            |
| デキサート6.6mg(D1,8)<br>肺CDDP+GEM+Necitumumab 4クール施行後 |                      |      |                 |

|             |  |  |  |
|-------------|--|--|--|
| <b>肺NGT</b> |  |  |  |
|-------------|--|--|--|

|                                   |                    |      |                 |
|-----------------------------------|--------------------|------|-----------------|
| 診療科名                              | 呼吸器内科              |      | 投与スケジュール：3w/クール |
| 薬剤名                               | 投与量                | 投与方法 |                 |
| ハイカムチン                            | 1mg/m <sup>2</sup> | 点滴静注 | D1-5            |
| グラニセトロン1mg(D1-5) デキサート6.6mg(D1-5) |                    |      |                 |

|  |                      |      |                 |
|--|----------------------|------|-----------------|
| <b>肺Nivolumab+CBDCA+PTX</b>  |                      |      |                 |
| 診療科名   | 呼吸器内科                |      | 投与スケジュール：3w/クール |
| 薬剤名  | 投与量                  | 投与方法 |                 |
| オブジーボ  | 360mg/body           | 点滴静注 | D1              |
| カルボプラチン  | AUC6                 | 点滴静注 | D1              |
| パクリタキセル  | 200mg/m <sup>2</sup> | 点滴静注 | D1              |
| ボララミン5mg(D1) ガスター20mg(D1) グラニセトロン1mg(D1)<br>デキサート19.8mg(D1) (内服)アブレピタント(D1-3) デカドロン8mg/day(D2-4) |                      |      |                 |

|                  |            |      |                 |
|------------------|------------|------|-----------------|
| <b>肺Nivo+Ipi</b> |            |      |                 |
| 診療科名             | 呼吸器内科      |      | 投与スケジュール：6w/クール |
| 薬剤名              | 投与量        | 投与方法 |                 |
| オブジーボ            | 240mg/body | 点滴静注 | D1,15,29        |
| ヤーボイ             | 1mg/kg     | 点滴静注 | D1              |

|                          |            |      |                 |
|--------------------------|------------|------|-----------------|
| <b>肺Nivo+Ipi (3週回し用)</b> |            |      |                 |
| 診療科名                     | 呼吸器内科      |      | 投与スケジュール：6w/クール |
| 薬剤名                      | 投与量        | 投与方法 |                 |
| オブジーボ                    | 360mg/body | 点滴静注 | D1,22           |
| ヤーボイ                     | 1mg/kg     | 点滴静注 | D1              |

|   |                      |      |                 |
|---|----------------------|------|-----------------|
| <b>肺Nivo+Ipi+CBDCA+PEM(1回目)</b>   |                      |      |                 |
| 診療科名  | 呼吸器内科                |      | 投与スケジュール：3w/クール |
| 薬剤名   | 投与量                  | 投与方法 |                 |
| オブジーボ   | 360mg/body           | 点滴静注 | D1              |
| ヤーボイ  | 1mg/kg               | 点滴静注 | D1              |
| ペメトレキシド   | 500mg/m <sup>2</sup> | 点滴静注 | D1              |
| カルボプラチン   | AUC=6                | 点滴静注 | D1              |
| グラニセトロン1mg(D1) デキサート9.9mg(D1)<br>(内服)アブレピタント(D1-3) デカドロン8mg/day(D2-4) ペメトレキシド投与開始の1週間以上前にVB12 1mgを筋注(9週間ごと)バンピタン1g/dayを内服開始 |                      |      |                 |

|   |                      |      |                 |
|---|----------------------|------|-----------------|
| <b>肺Nivo+Ipi+CBDCA+PEM(2回目)</b>   |                      |      |                 |
| 診療科名  | 呼吸器内科                |      | 投与スケジュール：3w/クール |
| 薬剤名   | 投与量                  | 投与方法 |                 |
| オブジーボ   | 360mg/body           | 点滴静注 | D1              |
| ペメトレキシド   | 500mg/m <sup>2</sup> | 点滴静注 | D1              |
| カルボプラチン   | AUC=6                | 点滴静注 | D1              |
| グラニセトロン1mg(D1) デキサート9.9mg(D1)<br>(内服)アブレピタント(D1-3) デカドロン8mg/day(D2-4) ペメトレキシド投与開始の1週間以上前にVB12 1mgを筋注(9週間ごと)バンピタン1g/dayを内服開始 |                      |      |                 |

|                                   |            |      |                 |
|-----------------------------------|------------|------|-----------------|
| <b>肺Nivo+Ipi+CBDCA+PEM(3回目以降)</b> |            |      |                 |
| 診療科名                              | 呼吸器内科      |      | 投与スケジュール：6w/クール |
| 薬剤名                               | 投与量        | 投与方法 |                 |
| オブジーボ                             | 360mg/body | 点滴静注 | D1,22           |
| ヤーボイ                              | 1mg/kg     | 点滴静注 | D1              |

|                                 |                      |      |                 |
|---------------------------------|----------------------|------|-----------------|
| <b>肺Nivo+Ipi+CBDCA+PTX(1回目)</b> |                      |      |                 |
| 診療科名                            | 呼吸器内科                |      | 投与スケジュール：3w/クール |
| 薬剤名                             | 投与量                  | 投与方法 |                 |
| オブジーボ                           | 360mg/body           | 点滴静注 | D1              |
| ヤーボイ                            | 1mg/kg               | 点滴静注 | D1              |
| パクリタキセル                         | 200mg/m <sup>2</sup> | 点滴静注 | D1              |

|  |       |      |    |
|--|-------|------|----|
| カルボプラチン  | AUC=6 | 点滴静注 | D1 |
| ポララミン5mg(D1) ガスター20mg(D1) グラニセトロン1mg(D1)<br>デキサート19.8mg(D1) (内服)アブレピタント(D1-3) デカドロン8mg/day(D2-4) |       |      |    |

#### 肺Nivo+Ipi+CBDCA+PTX(2回目)

|  |                      |      |                 |
|--|----------------------|------|-----------------|
| 診療科名   | 呼吸器内科                |      | 投与スケジュール：3w/クール |
| 薬剤名  | 投与量                  | 投与方法 |                 |
| オブジーボ  | 360mg/body           | 点滴静注 | D1              |
| バクリタキセル  | 200mg/m <sup>2</sup> | 点滴静注 | D1              |
| カルボプラチン  | AUC=6                | 点滴静注 | D1              |
| ポララミン5mg(D1) ガスター20mg(D1) グラニセトロン1mg(D1)<br>デキサート19.8mg(D1) (内服)アブレピタント(D1-3) デカドロン8mg/day(D2-4) |                      |      |                 |

#### 肺Nivo+Ipi+CBDCA+PTX(3回目以降)

|       |            |      |                 |
|-------|------------|------|-----------------|
| 診療科名  | 呼吸器内科      |      | 投与スケジュール：6w/クール |
| 薬剤名   | 投与量        | 投与方法 |                 |
| オブジーボ | 360mg/body | 点滴静注 | D1,22           |
| ヤーボイ  | 1mg/kg     | 点滴静注 | D1              |

#### 肺Nivo+Ipi+CDDP+PEM(1回目)

|   |                      |      |                 |
|---|----------------------|------|-----------------|
| 診療科名  | 呼吸器内科                |      | 投与スケジュール：3w/クール |
| 薬剤名   | 投与量                  | 投与方法 |                 |
| オブジーボ   | 360mg/body           | 点滴静注 | D1              |
| ヤーボイ  | 1mg/kg               | 点滴静注 | D1              |
| ペメトレキセド   | 500mg/m <sup>2</sup> | 点滴静注 | D1              |
| シスプラチン  | 75mg/m <sup>2</sup>  | 点滴静注 | D1              |
| グラニセトロン1mg(D1) デキサート9.9mg(D1)<br>(内服)アブレピタント(D1-3) デカドロン8mg/day(D2-4) ペメトレキセド投与開始の1週間以上前にVB12 1mgを筋注(9週間ごと)バンピタン1g/dayを内服開始 |                      |      |                 |

#### 肺Nivo+Ipi+CDDP+PEM(2回目)

|   |                      |      |                 |
|---|----------------------|------|-----------------|
| 診療科名  | 呼吸器内科                |      | 投与スケジュール：3w/クール |
| 薬剤名   | 投与量                  | 投与方法 |                 |
| オブジーボ   | 360mg/body           | 点滴静注 | D1              |
| ペメトレキセド   | 500mg/m <sup>2</sup> | 点滴静注 | D1              |
| シスプラチン  | 75mg/m <sup>2</sup>  | 点滴静注 | D1              |
| グラニセトロン1mg(D1) デキサート9.9mg(D1)<br>(内服)アブレピタント(D1-3) デカドロン8mg/day(D2-4) ペメトレキセド投与開始の1週間以上前にVB12 1mgを筋注(9週間ごと)バンピタン1g/dayを内服開始 |                      |      |                 |

#### 肺Nivo+Ipi+CDDP+PEM(3回目以降)

|       |            |      |                 |
|-------|------------|------|-----------------|
| 診療科名  | 呼吸器内科      |      | 投与スケジュール：6w/クール |
| 薬剤名   | 投与量        | 投与方法 |                 |
| オブジーボ | 360mg/body | 点滴静注 | D1,22           |
| ヤーボイ  | 1mg/kg     | 点滴静注 | D1              |

#### 肺Nivolumab

|       |            |      |                 |
|-------|------------|------|-----------------|
| 診療科名  | 呼吸器内科      |      | 投与スケジュール：2w/クール |
| 薬剤名   | 投与量        | 投与方法 |                 |
| オブジーボ | 240mg/body | 点滴静注 | D1              |

#### 肺Nivolumab(480mg,4w)

|       |            |      |                 |
|-------|------------|------|-----------------|
| 診療科名  | 呼吸器内科      |      | 投与スケジュール：4w/クール |
| 薬剤名   | 投与量        | 投与方法 |                 |
| オブジーボ | 480mg/body | 点滴静注 | D1              |

#### 肺Osimertinib+CBDCA+PEM

|      |     |      |                 |
|------|-----|------|-----------------|
| 診療科名 | 内科  |      | 投与スケジュール：3w/クール |
| 薬剤名  | 投与量 | 投与方法 |                 |

|   |                      |      |       |
|---|----------------------|------|-------|
| タグリッソ   | 80mg/day             | 内服   | D1-21 |
| ペメトレキセド   | 500mg/m <sup>2</sup> | 点滴静注 | D1    |
| カルボプラチン   | AUC5                 | 点滴静注 | D1    |
| グラニセトロン1mg(D1) デキサート9.9mg(D1)<br>(内服)アブレピタント(D1-3) デカドロン8mg/day(D2-4) ペメトレキセド投与開始の1週間以上前にVB12 1mgを筋注(9週間ごと)パンピタン1g/dayを内服開始 |                      |      |       |

|   |                      |      |                 |
|---|----------------------|------|-----------------|
| <b>肺Osimertinib+CDDP+PEM</b>  |                      |      |                 |
| 診療科名  | 呼吸器内科                |      | 投与スケジュール：3w/クール |
| 薬剤名   | 投与量                  | 投与方法 |                 |
| タグリッソ   | 80mg/day             | 内服   | D1-21           |
| ペメトレキセド   | 500mg/m <sup>2</sup> | 点滴静注 | D1              |
| シスプラチン  | 75mg/m <sup>2</sup>  | 点滴静注 | D1              |
| グラニセトロン1mg(D1) デキサート9.9mg(D1)<br>(内服)アブレピタント(D1-3) デカドロン8mg/day(D2-4) ペメトレキセド投与開始の1週間以上前にVB12 1mgを筋注(9週間ごと)パンピタン1g/dayを内服開始 |                      |      |                 |

|   |                      |      |                 |
|---|----------------------|------|-----------------|
| <b>肺PEM+Ami (80kg以上 5回目以降 維持療用法用)</b>   |                      |      |                 |
| 診療科名  | 内科                   |      | 投与スケジュール：3w/クール |
| 薬剤名   | 投与量                  | 投与方法 |                 |
| ペメトレキセド   | 500mg/m <sup>2</sup> | 点滴静注 | D1              |
| ライブリバント   | 2100mg/body          | 点滴静注 | D1              |
| デキサート6.6mg(D1) ガスター20mg(D1) ポララミン5mg(D1) アセリオ1000mg(D1)<br>(内服)デカドロン8mg/day(D2-3) ペメトレキセド投与開始の1週間以上前にVB12 1mgを筋注(9週間ごと)パンピタン1g/dayを内服開始 |                      |      |                 |

|   |                      |      |                 |
|---|----------------------|------|-----------------|
| <b>肺PEM+Ami (80kg未満 5回目以降 維持療用法用)</b>   |                      |      |                 |
| 診療科名  | 内科                   |      | 投与スケジュール：3w/クール |
| 薬剤名   | 投与量                  | 投与方法 |                 |
| ペメトレキセド   | 500mg/m <sup>2</sup> | 点滴静注 | D1              |
| ライブリバント   | 1750mg/body          | 点滴静注 | D1              |
| デキサート6.6mg(D1) ガスター20mg(D1) ポララミン5mg(D1) アセリオ1000mg(D1)<br>(内服)デカドロン8mg/day(D2-3) ペメトレキセド投与開始の1週間以上前にVB12 1mgを筋注(9週間ごと)パンピタン1g/dayを内服開始 |                      |      |                 |

|   |                      |      |                 |
|---|----------------------|------|-----------------|
| <b>肺PEM+Atezo (維持療用法用)</b>  |                      |      |                 |
| 診療科名  | 呼吸器内科                |      | 投与スケジュール：3w/クール |
| 薬剤名   | 投与量                  | 投与方法 |                 |
| テセントリク  | 1200mg/body          | 点滴静注 | D1              |
| ペメトレキセド   | 500mg/m <sup>2</sup> | 点滴静注 | D1              |
| グラニセトロン1mg(D1) デキサート6.6mg(D1)<br>(内服)デカドロン8mg/day(D2,3) ペメトレキセド投与開始の1週間以上前にVB12 1mgを筋注(9週間ごと)パンピタン1g/dayを内服開始 |                      |      |                 |

|   |                      |      |                 |
|---|----------------------|------|-----------------|
| <b>肺PEM+BEV</b>   |                      |      |                 |
| 診療科名  | 呼吸器内科                |      | 投与スケジュール：3w/クール |
| 薬剤名   | 投与量                  | 投与方法 |                 |
| ペメトレキセド   | 500mg/m <sup>2</sup> | 点滴静注 | D1              |
| ベバシズマブBS  | 15mg/kg              | 点滴静注 | D1              |
| グラニセトロン1mg(D1) デキサート6.6mg(D1)<br>(内服)デカドロン8mg/day(D2,3) ペメトレキセド投与開始の1週間以上前にVB12 1mgを筋注(9週間ごと)パンピタン1g/dayを内服開始 |                      |      |                 |

|   |            |      |                 |
|---|------------|------|-----------------|
| <b>悪性胸膜中皮腫Pembrolizumab (400mg,6w)</b>  |            |      |                 |
| 診療科名                                    | 呼吸器内科      |      | 投与スケジュール：6w/クール |
| 薬剤名                                     | 投与量        | 投与方法 |                 |
| キイトルーダ                                  | 400mg/body | 点滴静注 | D1              |
| CBDCA/CDDP+PEM+Pembro 6クール施行後の維持療法 最大2年 |            |      |                 |

| 悪性胸膜中皮腫Pembrolizumab (200mg,3w)          |            |      |                 |
|--|------------|------|-----------------|
| 診療科名                                     | 呼吸器内科      |      | 投与スケジュール：3w/クール |
| 薬剤名                                      | 投与量        | 投与方法 |                 |
| キイトルーダ                                   | 400mg/body | 点滴静注 | D1              |
| CBDCA/CDDP+PEME+Pembro 6クール施行後の維持療法 最大2年 |            |      |                 |

| 肺Pembrolizumab |            |      |                 |
|----------------|------------|------|-----------------|
| 診療科名           | 呼吸器内科      |      | 投与スケジュール：3w/クール |
| 薬剤名            | 投与量        | 投与方法 |                 |
| キイトルーダ         | 200mg/body | 点滴静注 | D1              |

| 肺Pembrolizumab (術後維持)          |            |      |                 |
|--------------------------------|------------|------|-----------------|
| 診療科名                           | 呼吸器外科      |      | 投与スケジュール：3w/クール |
| 薬剤名                            | 投与量        | 投与方法 |                 |
| キイトルーダ                         | 200mg/body | 点滴静注 | D1              |
| 術前Pembroレジメン4クール施行後のみ最大13クールまで |            |      |                 |

| 肺Pembrolizumab (400mg,6w) |            |      |                 |
|---------------------------|------------|------|-----------------|
| 診療科名                      | 呼吸器内科      |      | 投与スケジュール：6w/クール |
| 薬剤名                       | 投与量        | 投与方法 |                 |
| キイトルーダ                    | 400mg/body | 点滴静注 | D1              |

| 肺Pembrolizumab+CBDCA+PEM  |                      |      |                 |
|---|----------------------|------|-----------------|
| 診療科名  | 呼吸器内科                |      | 投与スケジュール：3w/クール |
| 薬剤名   | 投与量                  | 投与方法 |                 |
| キイトルーダ  | 200mg/body           | 点滴静注 | D1              |
| ペメトレキセド   | 500mg/m <sup>2</sup> | 点滴静注 | D1              |
| カルボプラチン   | AUC6                 | 点滴静注 | D1              |
| グラニセトロン1mg(D1) デキサート9.9mg(D1)<br>(内服)アブレピタント(D1-3) デカドロン8mg/day(D2-4) ペメトレキセド投与開始の1週間以上前にVB12 1mgを筋注(9週間ごと)バンピタン1g/dayを内服開始 |                      |      |                 |

| 肺Pembrolizumab+CBDCA+PTX   |                      |      |                 |
|--|----------------------|------|-----------------|
| 診療科名   | 呼吸器内科                |      | 投与スケジュール：3w/クール |
| 薬剤名  | 投与量                  | 投与方法 |                 |
| キイトルーダ   | 200mg/body           | 点滴静注 | D1              |
| カルボプラチン  | AUC6                 | 点滴静注 | D1              |
| パクリタキセル  | 200mg/m <sup>2</sup> | 点滴静注 | D1              |
| ボララミン5mg(D1) ガスター20mg(D1) グラニセトロン1mg(D1)<br>デキサート19.8mg(D1) (内服)アブレピタント(D1-3) デカドロン8mg/day(D2-4) |                      |      |                 |

| 肺Pembrolizumab+CBDCA+nabPAC   |                      |      |                 |
|---|----------------------|------|-----------------|
| 診療科名  | 呼吸器内科                |      | 投与スケジュール：3w/クール |
| 薬剤名   | 投与量                  | 投与方法 |                 |
| キイトルーダ  | 200mg/body           | 点滴静注 | D1              |
| アブラキサン  | 100mg/m <sup>2</sup> | 点滴静注 | D1,8,15         |
| カルボプラチン   | AUC6                 | 点滴静注 | D1              |
| グラニセトロン1mg(D1) デキサート9.9mg(D1)<br>(内服)アブレピタント(D1-3) デカドロン8mg/day(D2-4) |                      |      |                 |

| 肺Pembro+GEM+CDDP (術前)   |                       |      |                 |
|---|-----------------------|------|-----------------|
| 診療科名  | 呼吸器外科                 |      | 投与スケジュール：3w/クール |
| 薬剤名   | 投与量                   | 投与方法 |                 |
| キイトルーダ  | 200mg/body            | 点滴静注 | D1              |
| ゲムシタピン  | 1000mg/m <sup>2</sup> | 点滴静注 | D1,8            |
| シスプラチン  | 875mg/m <sup>2</sup>  | 点滴静注 | D1              |
| グラニセトロン1mg(D1) デキサート9.9mg(D1)・6.6mg(D8)<br>(内服)アブレピタント(D1-3) デカドロン8mg/day(D2-4) |                       |      |                 |

| 肺Pembrolizumab+PEM  |                      |      |                 |
|---|----------------------|------|-----------------|
| 診療科名  | 呼吸器内科                |      | 投与スケジュール：3w/クール |
| 薬剤名   | 投与量                  | 投与方法 |                 |
| キイトルーダ  | 200mg/body           | 点滴静注 | D1              |
| ペメトレキセド   | 500mg/m <sup>2</sup> | 点滴静注 | D1              |
| デキササート6.6mg(D1)<br>(内服)デカドロン8mg/day(D2,3) ペメトレキセド投与開始の1週間以上前にVB12 1mgを筋注（9週間ごと）パンピタン1g/dayを内服開始 |                      |      |                 |

| 肺Pembro+PEM+CDDP（術前）   |                      |      |                 |
|--|----------------------|------|-----------------|
| 診療科名   | 呼吸器外科                |      | 投与スケジュール：3w/クール |
| 薬剤名  | 投与量                  | 投与方法 |                 |
| キイトルーダ   | 200mg/body           | 点滴静注 | D1              |
| ペメトレキセド  | 500mg/m <sup>2</sup> | 点滴静注 | D1              |
| シスプラチン   | 75mg/m <sup>2</sup>  | 点滴静注 | D1              |
| グラニセトロン1mg(D1) デキササート9.9mg(D1)<br>(内服)アブレピタント(D1-3) デカドロン8mg/day(D2-4) ペメトレキセド投与開始の1週間以上前にVB12 1mgを筋注(9週間ごと)パンピタン1g/dayを内服開始 |                      |      |                 |

| 肺PEME   |                      |      |                 |
|---|----------------------|------|-----------------|
| 診療科名  | 外科                   |      | 投与スケジュール：3w/クール |
| 薬剤名   | 投与量                  | 投与方法 |                 |
| ペメトレキセド   | 500mg/m <sup>2</sup> | 点滴静注 | D1              |
| デキササート6.6mg(D1)<br>(内服)デカドロン8mg/day(D2,3) ペメトレキセド投与開始の1週間以上前にVB12 1mgを筋注（9週間ごと）パンピタン1g/dayを内服開始 |                      |      |                 |

| 肺PEME+CBDCA  |                      |      |                 |
|--|----------------------|------|-----------------|
| 診療科名   | 外科                   |      | 投与スケジュール：3w/クール |
| 薬剤名  | 投与量                  | 投与方法 |                 |
| ペメトレキセド  | 500mg/m <sup>2</sup> | 点滴静注 | D1              |
| カルボプラチン  | AUC5                 | 点滴静注 | D1              |
| グラニセトロン1mg(D1) デキササート9.9mg(D1)<br>(内服)アブレピタント(D1-3) デカドロン8mg/day(D2-4) ペメトレキセド投与開始の1週間以上前にVB12 1mgを筋注(9週間ごと)パンピタン1g/dayを内服開始 |                      |      |                 |

| 肺RAM+DTX                                    |                     |      |                 |
|---|---------------------|------|-----------------|
| 診療科名  | 呼吸器内科               |      | 投与スケジュール：3w/クール |
| 薬剤名   | 投与量                 | 投与方法 |                 |
| サイラムザ                                       | 10mg/kg             | 点滴静注 | D1              |
| ドセタキセル                                      | 60mg/m <sup>2</sup> | 点滴静注 | D1              |
| ボララミン5mg(D1) グラニセトロン1mg(D1) デキササート6.6mg(D1) |                     |      |                 |

| 肺VNR                                     |                     |      |                 |
|--|---------------------|------|-----------------|
| 診療科名                                     | 外科                  |      | 投与スケジュール：4w/クール |
| 薬剤名                                      | 投与量                 | 投与方法 |                 |
| ロゼウス                                     | 25mg/m <sup>2</sup> | 点滴静注 | D1,8,15         |
| グラニセトロン1mg(D1,8,15) デキササート6.6mg(D1,8,15) |                     |      |                 |

| 肺VNR-CBDCA   |                     |      |                 |
|--|---------------------|------|-----------------|
| 診療科名   | 外科                  |      | 投与スケジュール：4w/クール |
| 薬剤名  | 投与量                 | 投与方法 |                 |
| ロゼウス   | 25mg/m <sup>2</sup> | 点滴静注 | D1,8            |
| カルボプラチン  | AUC5                | 点滴静注 | D1              |
| グラニセトロン1mg(D1) デキササート9.9mg(D1)<br>(内服)アブレピタント(D1-3) デカドロン8mg/day(D2-4) |                     |      |                 |

| 肺VNR+GEM |       |  |                 |
|----------|-------|--|-----------------|
| 診療科名     | 呼吸器内科 |  | 投与スケジュール：4w/クール |

| 薬剤名                              | 投与量                   | 投与方法 |      |
|----------------------------------|-----------------------|------|------|
| ロゼウス                             | 25mg/m <sup>2</sup>   | 点滴静注 | D1,8 |
| ゲムシタビン                           | 1000mg/m <sup>2</sup> | 点滴静注 | D1,8 |
| グラニセロン1mg(D1,8) デキサート6.6mg(D1,8) |                       |      |      |

#### 肺イムデトラ (1回目)

| 診療科名             | 呼吸器内科     | 投与スケジュール |
|------------------|-----------|----------|
| 投与スケジュール：4w/クール  |           |          |
| 薬剤名              | 投与量       | 投与方法     |
| イムデトラ            | 1mg/body  | 点滴静注     |
| イムデトラ            | 10mg/body | 点滴静注     |
| D1,8,15          |           |          |
| デキサート6.6mg(D1,8) |           |          |

#### 肺イムデトラ (2回目以降)

| 診療科名            | 呼吸器内科     | 投与スケジュール |
|-----------------|-----------|----------|
| 投与スケジュール：2w/クール |           |          |
| 薬剤名             | 投与量       | 投与方法     |
| イムデトラ           | 10mg/body | 点滴静注     |
| D1              |           |          |